

INFORMATIVA PER INTERVENTO CHIRURGICO DI PLASTICA DEL PREPUZIO

Questa scheda contiene informazioni inerenti il trattamento proposto.
Siete comunque invitati a chiedere ogni ulteriore informazione durante il colloquio pre-operatorio.

PLASTICA DEL PREPUZIO in paziente affetto da FIMOSI

La fimosi è l'impossibilità di retrarre correttamente il che può comportare disturbi della minzione, infiammazione e infezione (balanopostiti).

L'intervento di **plastica dorsale del prepuzio** consiste in un "allargamento" della parte terminale stretta in modo da permettere l'esposizione corretta del glande. Questa necessità però nel post-operatorio di ginnastica prepuziale che se mal eseguita può portare a recidiva della fimosi.

L'alternativa è rappresentata dalla **circoncisione** in cui però viene asportato il prepuzio e quindi non sarà più possibile la ricopertura del glande (se non parzialmente) con la cute prepuziale.

L'intervento chirurgico deve essere eseguito per prevenire le possibili complicanze immediate e future (infezioni, disturbi nell'erezione, difficoltà nella minzione).


L'intervento prevede un ricovero, con un genitore, di circa 12-24 ore.

Nel decorso postoperatorio i malati possono generalmente assumere liquidi dopo circa 4 ore dal termine della procedura. La sintomatologia dolorosa è molto modesta e ben controllata con semplici farmaci analgesici. La dimissione avviene entro le 12/24 ore e solo se il malato presenta una buona diuresi, non lamenta dolore importante, non presenta vomito o febbre elevata. Il paziente dovrà essere sottoposto ad un controllo ambulatoriale, in genere dal curante, dopo circa 10 giorni dall'intervento o prima se necessario.

Il procedimento chirurgico non è privo di complicanze, le principali delle quali sono rappresentate da:

- * sanguinamento
 - * ematoma
 - * infezione
 - * stenosi del meato uretrale esterno (molto rara e necessita di correzione chirurgica o dilatazioni ambulatoriali)
- } In genere trattati ambulatorialmente, a volte necessitano di revisione chirurgica

Vi sono inoltre complicanze generiche in rapporto all'età, alle condizioni generali di salute, alla presenza di malattie conosciute o sconosciute.



Siete pregati di comunicare ai medici della Chirurgia Pediatrica qualsiasi dubbio o perplessità sull'intervento chirurgico affinché possano esservi forniti ulteriori chiarimenti.

Il medico è disposto a rispondere a qualsiasi altro quesito che riteniate opportuno anche perché il presente documento è comunque un sunto del colloquio avvenuto e potrebbe non essere completamente esaustivo. Il documento è inteso comunque come parte integrativa del percorso informativo relativo alla patologia di cui il paziente è affetto e ha funzione di conferma anche da parte del personale medico di aver fornito informazioni in modo adeguato e comprensibile.